

Sífilis congénita: Lo que necesitas saber



DEPARTAMENTO DE
SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE
CAROLINA DEL NORTE
División de Salud Pública

La sífilis congénita se produce cuando la infección por sífilis se transmite al bebé durante el embarazo o el parto. Los bebés que nacen con sífilis congénita a menudo no tienen síntomas al nacer. Si no se trata, los bebés pueden desarrollar síntomas más tarde y pueden morir a causa de la infección.



La sífilis congénita se puede prevenir mediante pruebas y tratamiento.

¿Cómo puede afectar al bebé la sífilis no tratada?



Durante el embarazo

- Pérdida del bebé/Aborto espontáneo
- Mortinato (nacimiento sin vida)
- Nacimiento antes de tiempo/prematuro
- Bajo peso al nacer



Después del nacimiento/parto

- Huesos deformes
- Anemia grave (conteo sanguíneo bajo)
- Erupciones en la piel (sarpullido)
- Ictericia (coloración amarillenta en la piel o los ojos)
- Meningitis
- Muerte poco después del nacimiento

Sífilis congénita en Carolina del Norte: Lo que sabemos.

Casos de sífilis congénita en Carolina del Norte



En 2024, los casos aumentaron un 9500 % en comparación con 2012.

Los casos aumentaron entre la mayoría de los grupos raciales y étnicos.

Los casos aumentaron en comunidades urbanas y rurales.

Dale vuelta a la página para ver información sobre prevención y recursos comunitarios



Sífilis congénita: Lo que necesitas saber



DEPARTAMENTO DE
SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE
CAROLINA DEL NORTE
División de Salud Pública

¿Cómo puedo evitar que mi bebé contraiga sífilis?

- Apoya a las personas embarazadas para que reciban atención desde el principio del embarazo.
- Asegura que TODAS LAS personas embarazadas se sometan a pruebas en su **primera visita de atención prenatal, entre las 28 y 30 semanas de gestación y en el momento del parto. ¡Esta es la ley de Salud Pública de Carolina del Norte!**
- Asegura que los bebés que nacen con sífilis reciban el tratamiento adecuado antes de ser dados de alta.

¿Cuál es el tratamiento recomendado?

- Las personas que dan positivo en la prueba de sífilis pueden ser tratadas con penicilina (inyectada) o doxiciclina que se toma via oral (por la boca).



¿Dónde puedo encontrar recursos disponibles en la comunidad?

Mapa de tasas de sífilis



Recursos sobre la sífilis para
proveedores



CDC: Pautas de tratamiento para
infecciones de transmisión sexual
(ITS)



Localizador de pruebas gratuitas
para enfermedades de transmisión
sexual (ETS)



Sífilis: lo que necesitas saber




DEPARTAMENTO DE
SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE
CAROLINA DEL NORTE
División de Salud Pública

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS).

Las personas pueden contraerla a través del sexo vaginal, anal u oral.

| Se desarrolla en etapas y es más contagiosa durante las primeras etapas de la infección (etapas *primaria* y *secundaria*).



Puede ser difícil saber si tienes sífilis.

La única manera de estar seguro es hacerte la prueba.



Si das positivo, debes recibir tratamiento de inmediato para evitar que la infección progrese. La infección por sífilis se puede tratar con antibióticos. **Las parejas sexuales también deben recibir tratamiento.**



La sífilis se puede transmitir a los bebés durante el embarazo o el parto.

La sífilis en un bebé se llama sífilis congénita. Se puede evitar mediante las pruebas y el tratamiento oportunos durante el embarazo.

Cualquier persona embarazada debe hacerse la prueba de sífilis en su **primera visita de atención prenatal, entre las 28-30 semanas de gestación y en el momento del parto.**

Es la Ley de Salud Pública de Carolina del Norte

TODOS los bebés que nacen con sífilis deben recibir tratamiento de inmediato.

Puede que algunos bebés no tengan síntomas al nacer. Si no reciben el tratamiento, los bebés pueden desarrollar síntomas más tarde y pueden morir a causa de la infección.

