

Información sobre la gripe aviaria para cazadores



DEPARTAMENTO DE
SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE
CAROLINA DEL NORTE
División de Salud Pública



Visita [USDA: Plan de implementación para la vigilancia de la influenza aviar en aves acuáticas en EE. UU.](#)

La influenza aviar, o “gripe aviaria”, es una enfermedad causada por el virus de la influenza A que generalmente se transmite entre aves, aves de caza y aves acuáticas, no entre personas. En Carolina del Norte, la gripe aviaria ha afectado principalmente a aves acuáticas, aves rapaces como águilas calvas y buitres negros, y otras aves acuáticas como gaviotas, cormoranes de doble cresta y pelícanos pardos.

La influenza aviar se transmite entre aves, aves de caza y aves acuáticas a través del contacto directo. En casos raros, los humanos pueden enfermarse después de estar en contacto con un animal infectado. También puede propagarse a través de superficies y materiales contaminados, incluida la ropa, los zapatos o las manos de las personas. Sigue estas recomendaciones para protegerte de la gripe aviaria.

Cuando estés cazando

- No coseches ni manejes aves, silvestres o domésticas, que estén obviamente enfermas o muertas.



- Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después de manejar animales de caza.



Detectar y reportar

Los informes de vida silvestre enferma o herida se pueden enviar a la línea de ayuda de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. al 1-866-318-2401 o en cualquier momento por correo electrónico a HWI@ncwildlife.org.

Cuando prepares aves, aves de caza y aves acuáticas

- Utiliza siempre guantes desechables cuando manejes o limpies animales de caza. Lávate las manos con jabón y agua tibia cuando hayas terminado.
- Prepara aves de caza en el campo siempre que sea posible.
- Si no puedes preparar las aves en el campo, límpalas en un lugar bien ventilado, lejos de las aves de corral y otras aves.
- Mantén un par de zapatos aparte para usarlos únicamente en el área de limpieza.



- Utiliza herramientas dedicadas para limpiar caza. No utilices esas herramientas cerca de aves de corral o mascotas.
- Lava todas las herramientas y superficies de trabajo con agua y jabón. Luego, desinfectalos con una solución de cloro recién mezclada que contenga 1/3 de taza de lejía doméstica por 1 galón de agua.



1/3 taza

+



1 gal

- Embolsa en doble bolsa las entrañas y las plumas.
- Coloca la bolsa en un bote de basura al que las aves de corral y las aves de mascota no puedan acceder. Asegúrate de que el bote de basura esté cubierto y que los niños, las mascotas u otros animales no puedan abrirlo.



x 2



Precauciones adicionales

- Usa guantes desechables mientras limpias los comederos. Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después.



- No comas, bebas ni te metas nada a la boca mientras limpias o manejas animales de caza.



- Evita la contaminación cruzada. Mantén la caza cruda en un recipiente aparte, lejos de alimentos cocidos o listos para comer.



- Cocina completamente la carne de caza; La temperatura interna debe alcanzar los 165°.



Si te sientes enfermo después de manejar animales silvestres

Comunícate con tu proveedor de atención médica, clínica de salud ocupacional o departamento de salud local. Avisa a tu proveedor sobre cualquier contacto reciente con animales. En caso de emergencia, llama al 911.

Vigila los síntomas

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| -Enrojecimiento de los ojos | -Dolor de garganta | -Falta de aliento | -Dolor muscular |
| -Fiebre | -Flujo nasal | -Fatiga | -Dolor de cabeza |
| -Tos | -Estornudos | -Vómito | -Náusea |
| -Erupciones | -Diarrea | | -Convulsiones |