

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS). Es causada por una bacteria y se desarrolla en etapas. Es más contagiosa durante las primeras etapas de la infección (*primeros 12 meses después de la exposición*). Los signos y síntomas pueden ser sutiles y pueden pasarse por alto fácilmente. **La sífilis se puede prevenir y curar con antibióticos.**

**La sífilis puede transmitirse al bebé durante el embarazo o en el momento del parto. Esto se conoce como sífilis congénita.*

¿Cuáles son las etapas de la sífilis?

Sífilis primaria


- Una sola llaga o varias llagas que no duelen, llamadas chancros, que aparecen de 1 a 3 meses después de la exposición.
- Los chancros aparecen en el sitio en el que la bacteria ingresa al cuerpo.

Sífilis secundaria

- Erupción en la piel (sarpullido), ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta, fiebre, pérdida de cabello, dolores musculares y/o fatiga.
- Los síntomas secundarios ocurren de 3 a 6 meses después de la exposición.

Sífilis latente

- No hay síntomas, pero la infección todavía está presente.
- La mayoría de los casos se diagnostican en esta etapa.
- El daño a los órganos puede ocurrir 10 a 30 años después de la infección inicial.



Los síntomas de la sífilis pueden desaparecer sin tratamiento. Debes recibir tratamiento para evitar que la infección pase a la siguiente etapa.



¿Qué tan común es la sífilis?

- El número de casos tempranos de sífilis en Carolina del Norte ha aumentado en los últimos 20 años.
En 2024, se reportaron 3,665 infecciones tempranas de sífilis.
- La sífilis es más común entre los hombres, pero los casos entre las mujeres han aumentado en los últimos años.
- Casi 4 de cada 10 casos reportados fueron en personas de entre 25 y 34 años.
- Más de la mitad (55 %) de los casos reportados fueron entre personas negras/afroamericanas.

Debes hacerte la prueba de sífilis si:

- Tienes una vida sexualmente activa con una nueva pareja (o parejas).
- Estás en una relación sexual abierta.
- Tienes una pareja sexual (o parejas sexuales) con un resultado positivo en la prueba de sífilis.
- Estás tomando PrEP o PEP para la prevención del VIH y las ITS .
- Tienes un embarazo (TODAS las personas embarazadas deben hacerse la prueba de sífilis en su **primera visita de atención prenatal, entre las 28 y 30 semanas de gestación, y en el momento del parto. Es la Ley de Salud Pública de Carolina del Norte**).

¿Cómo sé si tengo sífilis?

La única manera segura de saberlo es hacerte un análisis de sangre con un médico o en una clínica.

¿Cómo se trata la sífilis?

- **Las personas que dan positivo en la prueba de sífilis deben recibir tratamiento tan pronto se sospeche o se confirme.**
- La sífilis se puede tratar con penicilina G (*administrada en forma de inyección*). La doxiciclina puede administrarse como tratamiento alternativo para personas alérgicas a la penicilina.

Sífilis: Lo que necesitas saber



DEPARTAMENTO DE
SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE
CAROLINA DEL NORTE
División de Salud Pública

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS).

Las personas pueden contraerla a través del sexo vaginal, anal u oral. Se desarrolla en etapas y es más contagiosa durante las primeras etapas de la infección (etapas *primaria* y *secundaria*).



Puede ser difícil saber si tienes sífilis. La única manera de estar seguro es hacerte la prueba.



Si das positivo, debes recibir tratamiento de inmediato para evitar que la infección progrese. La infección por sífilis se puede tratar con antibióticos. **Las parejas sexuales también deben recibir tratamiento.**



La sífilis se puede transmitir a los bebés durante el embarazo o el parto. La sífilis en un bebé se llama sífilis congénita. Se puede evitar mediante las pruebas y el tratamiento oportunos durante el embarazo.

Cualquier persona embarazada debe hacerse la prueba de sífilis en su **primera visita de atención prenatal, entre las 28-30 semanas de gestación y en el momento del parto.**

Esta es la Ley de Salud Pública de Carolina del Norte

TODOS los bebés que nacen con sífilis deben recibir tratamiento de inmediato. Puede que algunos bebés no tengan síntomas al nacer. Si no reciben el tratamiento, los bebés pueden desarrollar síntomas más tarde y pueden morir a causa de la infección.

