

Place Patient Label Here

## Solicitud y consentimiento para anticonceptivos de barrera (condones masculinos o femeninos, diafragma)

**Declaración de participación voluntaria y confidencialidad:** Los servicios bajo el Título X son completamente voluntarios. Acepto recibir los servicios por voluntad propia. Entiendo que el personal no me puede obligar a recibir los servicios ni a usar o no usar un método de planificación familiar en particular. Entiendo que tengo derecho a aceptar o rechazar los servicios de planificación familiar y que esto no hará que me nieguen otros servicios o programas que ofrezca esta agencia. Esta información es confidencial y se tratará como tal.

Los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios buenos y malos o complicaciones, que pueden perjudicarme. Me han informado que los beneficios, riesgos y efectos secundarios más frecuentes son los que se mencionan a continuación. Pueden ocurrir otros que no están en la lista.

**Eficacia del uso de los condones: 87–98 por ciento**  
**Eficacia del uso del diafragma con espermicida: 83 por ciento**

<b>Beneficios</b>	<b>Posibles riesgos y desventajas</b>	<b>Efectos secundarios posibles</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Los condones pueden obtenerse con facilidad. No hace falta receta.</li><li>2. Son discretos: pueden llevarse ocultos en la cartera o bolso.</li><li>3. Los condones de látex ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.</li><li>4. Los condones masculinos permiten que los hombres compartan la responsabilidad del control de la natalidad.</li><li>5. Pueden usarse durante la lactancia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deben usarse cada vez que se tienen relaciones sexuales.</li><li>2. Los lubricantes con base de aceite pueden dañar el látex.</li><li>3. Puede interrumpir las relaciones sexuales.</li><li>4. Mayor riesgo de infecciones pélvicas en el caso del diafragma.</li><li>5. El tamaño del diafragma lo debe determinar un profesional médico.</li><li>6. El diafragma debe dejarse puesto durante seis horas después de tener relaciones sexuales, aunque no más de 24 horas</li><li>7. El diafragma debe usarse con espermicida.</li><li>8. Puede que sea necesario cambiar el tamaño del diafragma después de dar a luz, un aborto espontáneo o provocado, o subir o bajar más de 10 libras.</li><li>9. No puede usarse un diafragma durante las seis primeras semanas después de dar a luz.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reacción alérgica al látex u otros componentes.</li><li>2. Puede producir irritación vaginal debido a la colocación incorrecta del diafragma o por el espermicida, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluido el VIH.</li></ol>

*Contraceptive Technology; 22 ed. 2023*

